



## Papillomavirus nel maschio

### Cose da sapere e da fare

Ormai è accertato che l'infezione da Papillomavirus si contrae, nella maggioranza dei casi, con un rapporto sessuale, tuttavia non si possono escludere altre vie di contagio (es. da contatto indiretto), ma questa evenienza è soltanto una eccezione e non la regola. Se ne deduce chiaramente che anche l'uomo e non soltanto la donna può incontrare il Papillomavirus (HPV) nel corso della sua vita sessuale. Questi virus sono tanti ma non sono tutti uguali e possono dare problematiche diverse a seconda del tipo. Si può semplificare dicendo che c'è molta differenza fra i Papillomavirus a basso rischio e quelli ad alto rischio (oncogeno).

#### **Nel maschio**

i virus HPV a basso rischio si manifestano con piccole verruche a livello genitale molto contagiose, dette condilomi, che guariscono senza lasciare problemi con trattamenti adeguati (laser, creme ecc.). Anche solo nel dubbio di aver contratto l'infezione, è bene che l'uomo corra dal suo medico curante o dal dermatologo per farsi vedere perché più piccoli e meno numerosi sono i condilomi e più è semplice la terapia e veloce la guarigione. È opportuno che anche la partner si faccia controllare dal suo ginecologo per escludere di avere dei condilomi all'interno dei genitali.

I virus HPV ad alto rischio nel maschio non danno problemi e non sono pericolosi nella stragrande maggioranza dei casi, a differenza della donna, e soltanto in casi "rarissimi" possono causare malattia, perciò a tutt'oggi non è prevista una prevenzione negli uomini. Ultimamente è stato approvato l'uso del vaccino contro l'HPV anche per i ragazzi (che ne fanno richiesta), ma soltanto al fine di impedire la diffusione del Papillomavirus.

Nel maschio non è indicato ricercare il virus con l'HPVtest, come si fa nella donna, perché non serve e non sono necessari per lui controlli specifici se la sua partner presenta lesioni sul collo dell'utero rilevate dal PAPtest e dalla Colposcopia. Dobbiamo inoltre tener presente che non è possibile stabilire quando è avvenuta l'infezione da Papillomavirus, perché questi virus possono rimanere silenti e non dare alcun segno della loro presenza anche per moltissimi anni. Quindi è "impossibile" stabilire all'interno di una coppia chi ha avuto prima l'infezione da HPV: è inutile cercare di sapere di chi è "la colpa" del problema perché è impossibile sapere con certezza a quando risale l'incontro con questo virus. L'importante quando si parla di infezione da Papillomavirus è farsi controllare dallo Specialista di fiducia e seguire scrupolosamente i suoi consigli per evitare problemi in entrambi i partner!